

## ПИТАЊА СА ТАЧНИМ ОДГОВОРИМА – КОМПЛЕТ 1

1. Који је најчешћи узрочник тешке дијареје код деце праћене озбиљном дехидрацијом:
  - a. adenovirus
  - b. salmonella
  - v. rotavirus**
  - г. giardia lamblia
2. Наведи која протозоа је најзаступљенија као узрочник дијареје у деце:

**Giardia lamblia**
3. Одојчету са акутним дијарејалним поремећајем које сиса подоје треба:
  - a. наставити без прекида**
  - б. обуставити 6-8 сати
  - в. обуставити 24 сата
  - г. заменени са формулом крављег млека без лактозе
4. Како је настао нови рекомбинантни вирус А(Х1Н1)?
  - а. у лабораторијским условима,
  - б. миксовањем свињског, птичијег и хуманог вируса инфлуенце**
  - в. индустријски
5. У којој мери болести коже утичу на квалитет живота деце и младих? (заокружити један одговор)
  - а. мало
  - б. умерено
  - в. изразито**
6. Главни ризик за оболелог од НИД у добу одојчета јесте:
  - а. слаб унос хране
  - б. хипернатремијска дехидрација**
  - в. ниски раст
  - г. дилатација уротракта
7. Аутозомно доминантна полицистична болест бубрега се :
  - а. најчешће јавља у периоду детињства
  - б. испољава раним почетком у периоду детињства у свега 2-5% болесника**
  - в. јавља са једнаком учесталашћу и у периоду детињства и у адултном периоду
  - г. искључиво испољава у адултном периоду
8. Нефротоксичност аминогликозида се смањује (тачни су одговори)
  - а. терапијом у једној дневној дози**
  - б. корекцијом хипоалбуминемије, хипокалемије**
  - в. коришћењем мањих доза од прописаних
  - г. терапија краћа од 2 недеље

9. Желудачни садржај је микробиолошки:
- а. стерилан
  - б. само је повремено позитиван
  - в. увек позитиван**
10. Пuteви ширења инфекције *H. Pylori* су:
- а. орално-орални и феко-орални
  - б. контакт са повраћеним масама инфициране особе
  - в. преко сировог воћа и поврћа
  - г. сви наведени путеви**
11. На окултни гастроинтестинални губитак крви треба мислити код болесника са:
- а. опстипацијом
  - б. крваво-слузавом дијарејом
  - в. сидеропенијском анемијом непознатог узрока**
  - г. уринарном инфекцијом
12. Најкарактеристичнији знак при прегледу абдомена болесника с акутним апендицитисом је:
- а. дистензија абдомена
  - б. тумефакција у абдомену
  - в. видљива цревна перисталтика
  - г. локализована болна осетљивост**
13. Антибиотици избора за микоплазма пнеумонију су:
- а. цефалоспорини
  - б. макролиди**
  - в. пеницилини
  - г. аминокликозиди
14. Синдром примарне цилијарне дискинезије (ПЦД) настаје због:
- а. недостатка цилија на ћелијама цилијарног епитела;
  - б. дисфункције хлорног канала узроковане мутацијом гена за ЦФТР;
  - в. поремећајем структуре и функције цилија на ћелијама респираторног епитела**
  - г. свег наведеног
15. Шта је неопходни елемент безбедног сексуалног понашања?
- а. редовна употреба ефикасне контрацепције
  - б. редовно коришћење кондома**
  - в. скрининг на најчешће узрочнике полно преносивих инфекција
  - г. вакцинација против хепатитиса Б и инфекције хуманим папилома вирусом
16. Сексуални хормони, заједно са хормонима хипоталамо-питуитарне осовине:
- а. производе полно специфичне ефекте на имунски систем**
  - б. не производе полно специфичне ефекте на имунски систем
  - в. немају никакав значај на имунски систем

17. Тешка комбинована имунодефицијенција:
- а. орална кандидијаза
  - б. респираторне и гастроинтестиналне инфекције у првим месецима живота
  - в. орална кандидијаза, респираторне и гастроинтестиналне инфекције у првим месецима живота
18. Имуни систем се током инфекције активира са циљем да:
- а. ствара антитела
  - б. елиминише и уништи узрочника болести
  - в. изазива лизу ћелија
19. Највећу групу конгениталних анормалија чине:
- а. анормалије мозга
  - б. анормалије срца
  - в. анормалије гастроинтестиналног тракта
20. Ахондроплазија је:
- а. хромозомска болест
  - б. моногенска болест
  - в. мултифакторска болест
21. Најважнији клинички критеријуми за нарколепсију су:
- а) катаплексија, дневна поспаност, хипнагогне халуцинације, парализе у сну
  - б) поремећај понашања, несаница
  - в) често ноћно буђење, хипнагогне халуцинације
22. Парасомније се карактеришу:
- а) разноврсним поремећајем понашања током спавања
  - б) поремећајем свести током буђења
  - в) амнезијом због коришћења психоактивних супстанци
23. За дијагнозу несанице потребно је да се проблеми са спавањем јављају :
- а) искључиво сваке ноћи
  - б) најмање три пута недељно
  - в) једанпут недељно
24. Најчешћи узрок напрасне смрти одојчета је:
- а. конвулзивни напад у сну
  - б. непрепозната насилна смрт (најчешће угушење)
  - в. поремећај срчаног ритма
  - г. хипоксија и хиперкапнија код одојчета са поремећеним регулаторним механизма можданог стабла
25. Најчешће примењивано емболизационо средство у дечијој кардиологији је:
- а. Flipper coil
  - б. Amplatzer duct occluder
  - в. Gianturco coil
  - г. Tornado coil

26. Тежак ток и неповољан исход инфекције респираторним вирусима се очекује са већом вероватноћом :
- а. код превремено рођене деце, у случају постојања БПД или урођене срчане мане
  - б. код деце из породица са лошијим условима становања
  - в. у случају мајки које пуше у трудноћи и после порођаја
  - г. у свим наведеним случајевима
27. У случају инфекције мајке вирусом инфлуенце А Н<sub>1</sub>Н<sub>1</sub> дојење је:
- а. пожељно увек када су испуњени одређени предуслови
  - б. контриндиковано због ризика инфекције новорођенчета
  - в. увек индиковано
  - г. зависно од индивидуалне процене
28. У супституционој терапији централног дијабетеса инсипидуса у првом реду се користи:
- а. дезмопресин
  - б. хлорпропамид
  - в. хидрохлоротиазид
  - г. карбамазепин
29. КАХ са дефектом 11β-хидроксилазе карактерише:
- а. хипертензија и вирилизација на рођењу
  - б. хипотензија и вирилизација на рођењу
  - в. хипотензија и двосмислени генитал на рођењу
  - г. хипертензија и двосмислене (хермафродитне) гениталије на рођењу
30. Дете од 2 године је слепо од рођења, споро расте и има понављане тешке хипогликемије. Клиничка слика указује да дете највероватније има:
- а. Адисонову болест
  - б. Беквит-Видеманов синдром
  - в. септо-оптичку дисплазију
  - г. хиперинсулинизам
31. Најважнија улога митохондрија у ћелији је:
- а. детоксикација организма
  - б. стварање једињења богатих енергијом
  - в. стварање мијелина
32. Који од хормона подстиче липолизу у првим данима живота:
- а. хормон раста
  - б. инсулин
  - в. адреналин
  - г. кортизол
33. Ризици процеруралне седације код деце су најчешће:
- а. хиповентилација и апнеа
  - б. бубрежна инсуфицијенција
  - в. инсуфицијенција јетре

34. Кардиомиопатија и срчана инсуфицијенција најчешћи су нежељени касни ефекти (заокружити тачан одговор)
- а. глукокортикоидне терапије
  - б. антрациклина (доксорубицин, адриаамин)**
  - в. онковина (винкрестина)
35. У имунокомпромитованих особа са инфекцијом вирусом инфлуенце *H1N1* период у коме је пацијент заразан је у односу на заражене претходно здраве особе:
- а. продужен**
  - б. скраћен
  - в. непромењен
36. Који режим кондиционирања се најчешће примењује код деце
- а. комбинована високодозна хемиотерапија**
  - б. зрачење целог тела и комбинована високодозна хемиотерапија
  - в. редуковани режим кондиционирања
37. У клиничкој пракси се за формирање слике помоћу магнетне резонанце користи:
- а. молекула угљоводоника
  - б. електронски омотач атома кисеоника
  - в. језгро атома водоника**
38. У етиологији акутних уртикарија код деце предшколског узраста најчешће се налази:
- а. инфекција**
  - б. алергија на млеко
  - в. алергија на јагоде
  - г. алергија на кикирики
39. У терапији егзантема индикувана је примена:
- а. дијете
  - б. H2 антихистаминика
  - в. H1 антихистаминика**
  - г. преднизона 3-5 мг/кг тт
40. У антропофилне специјесе гливица спада:
- а. *Trichophyton mentagrophytes* var. *granulare*
  - б. *Microsporum canis*
  - в. *Microsporum audouinii***
  - г. *Microsporum gypseum*